



Uw kat mee naar huis nemen vanaf de kliniek



Naar huis gaan

Na een verblijf van uw kat in de kliniek kan het zijn dat uw kat extra aandacht nodig heeft nadat hij thuisgekomen is.

- Als uw kat die dag onder narcose is geweest dan kan uw kat nog wat stil en teruggetrokken of wat wankel zijn.
- Uw kat kan nerveus en gedesoriënteerd zijn - praat tegen uw kat en aai rustig, geef de kat de mogelijkheid tot meer contact als hij/zij dat op prijs stelt.
- Voorkom dat uw kat kan likken aan wonden of kan trekken aan hechtingen. Als uw kat dit toch doet, vraag dan aan uw dierenarts een speciale kraag of romper die hij tijdelijk om/aan kan om dit te voorkomen.
- Bel uw dierenarts als u roodheid, zwelling of vocht van/uit de wond ziet of als u het gevoel heeft dat uw kat niet goed herstelt.
- Zorg dat u alle medicijnen geeft die voorgeschreven zijn.
- Pijn is bij katten erg moeilijk te herkennen, soms uit zich dit in: minder eetlust, verstopen of terugtrekken. Mocht u dit zien, neem dan contact op met de kliniek.
- Het is mogelijk dat u uw kat gedurende de eerste nacht of voor een langere periode binnen moet houden.
- Zorg voor een rustige, warme plek in huis waar uw kat kan rusten.

Herintroductie bij andere katten in huis

Uw kat heeft in de kliniek een onbekende geur opgepikt, vooral na een langer verblijf. Deze geur kan andere katten in het huishouden wat bang en terughoudend maken, het is daarom het best om uw katten rustig te herintroduceren.

- Zorg dat u aanwezig bent als de katten elkaar weer zien.
- Zorg dat de kat die thuis komt niet overweldigd wordt door aandacht van mensen of huisdieren.

- Zorg dat de kat de geur van thuis op kan pikken voordat u hem/haar weer introduceert bij de andere kat(ten).
- Indien nodig, kunt u de katten 1-2 dagen uit elkaar houden en geleidelijk introduceren.
- Was alle doeken die u meeneemt vanaf de kliniek om ze te ontdoen van de geur van de kliniek.
- Meng de geuren van de katten door de katten om de beurt te aaien. Aai hiervoor voornamelijk rond de kop.
- De favoriete rust plek van uw kat(ten) kunnen eventueel gesprayd worden met Feliway® (een kattenferomoon dat zorgt voor vermindering van stress).



Uw kat eten geven

Na een operatie of opname kan het zijn dat uw kat niet direct wil eten. Om het eten te stimuleren kunt u het volgende proberen:

- Verwarm natvoeding (blik/zakje) tot lichaamstemperatuur.
- Biedt heel lekker voer aan, zoals kattenvoer of speciaal recovery voer van de dierenarts.
- Voer vaak, nieuwe, kleine hoeveelheden voer en haal het bakje weg tussen de verschillende voedingen.
- Probeer eventueel met de hand het voer aan uw kat aan te bieden, daarbij kunt u hem motiveren door te praten en te aaien.
- Smeer wat natvoeding op de voorpoot van de kat, dit kan zorgen dat hij start met eten als hij het schoon likt.
- Gebruik een ondiep bakje of bordje zodat de snorharen niet de rand raken, irritatie van de snorharen tijdens het eten vinden de meeste katten niet fijn.
- Neem contact op met de kliniek als uw kat langer dan één tot twee dagen niet eet.

Twijfel?!

Als er ook maar iets is waar u zich zorgen over maakt, neem dan contact op met de kliniek.

