

Aankoopprotocol

Insleep Risico's

Elk aangevoerd dier vormt een risico op insleep van ziektes in de koppel. Maar ook ander dierlijk materiaal, zoals sperma, kan ziektes met zich meebrengen.

Achtergrondinformatie

Controleer de CAE en CL status bij de GD. Dit kan door telefonisch contact op te nemen.

- Vraag ook na wanneer er voor het laatst getapt is.
- Controleer de huidige status in tankmelk wanneer er langer dan 3 maanden geleden voor het laatst getapt is. Bedenk wel dat een beginnende CAE infectie hierbij niet aan het licht zal komen.

Vraag voor aankoop de volgende verschijnselen en ziektes na:

- Hebben er afgelopen jaar meer dan 5% van de dieren verworpen? Zo ja, is er onderzoek uitgevoerd?
- Wordt er tegen chlamydia gevaccineerd?
- Welke maatregelen rondom para-tbc worden er uitgevoerd; vaccineren, onderzoek in de koppel?
- Vraag de gezondheidsstatus bij de opfok uit, welke longproblemen spelen er? Is er meer dan 10% uitval geweest afgelopen jaar en zo ja, is de oorzaak onderzocht?
- Is het bedrijf bekend met infectieuze blindheid / houw?
- Is er een scrapie status?

Extra controle

Vraag een tankmelk monster voor onderzoek op CAE, CL en para-tbc

Testen en quarantaine

Alle aangevoerde dieren kunnen het beste in quarantaine geplaatst worden.

Dieren in quarantaine dienen geen contact te hebben met overige dieren op het bedrijf. Bij voorkeur in een andere stal. Wanneer dit niet mogelijk is dient er een minimale afstand van 2 meter tot andere dieren aangehouden te worden.

Let verder ook op looproutes en gebruik van materialen.

Tap de aan te kopen dieren waar mogelijk op het bedrijf van herkomst en laat vervoer pas plaats vinden wanneer de dieren CAE en CL onverdacht getest zijn. Is het niet mogelijk om de dieren op het bedrijf van herkomst te onderzoeken tap ze dan bij aankomst en plaats ze in quarantaine. Laat de dieren ook na een eerste onverdachte uitslag een maand in quarantaine staan. Tap daarna nogmaals.

Bij twee testuitslagen waarin het CAE virus nog antilichamen zijn aangetoond kan het dier met een acceptabel risico bij de koppel gevoed worden. Controleer eveneens voor CL in deze periode, waarbij ook een klinische inspectie met controle van de lymfeknopen hoort.

