

Een hoefzweer is een ontsteking van de hoeflederhuid (huid onder de zool) en is te vergelijken met een ontsteking onder de nagel bij mensen. Door een verminderde kwaliteit van de zool en dan met name van de witte lijn, kunnen vuil en kleine steentjes makkelijker door de zool omhoog kruipen en een ontsteking veroorzaken. Hoefzweren zijn grotendeels te voorkomen door paarden correct en tijdig te bekappen of te beslaan en te zorgen voor een goede stalhygiëne.

Verschijnselen

Geleidelijk toenemende kreupelheid, paard kan erg kreupel worden, warme hoef, koorts, pijnlijke plek in de zool of wand, soms breekt een hoefzweer door aan de kroonrand. De kroonrand is dan vochtig en warm.

Behandeling

Waarschuw bij het vermoeden van een hoefzweer de dierenarts of de hoefsmid, zodat de ontsteking geopend en behandeld kan worden. In eerste instantie zal worden vastgesteld door middel van visitatie van de hoef op welke plek de hoefzweer zit. Dan wordt er geprobeerd de hoefzweer uit te snijden zodat het ontstekingsmateriaal (pus) eruit kan. Doordat het ontstekingsmateriaal uit de hoef kan, zal meteen de druk in de lederhuid verminderen waardoor ook de pijnlijkheid afneemt.

Wanneer de zool heel erg hard is wordt er door de dierenarts vaak gekozen het paard in een nat hoefverband te plaatsen. Dit natte hoefverband verweekt de zool voor een deel waardoor het uitsnijden van de zweer makkelijker gaat. Het natte hoefverband wordt meestal niet langer dan 24 uur om gehouden. De dierenarts zal na het uitsnijden van de hoefzweer een verder plan maken, dit is afhankelijk van de diepte en de uitgebreidheid van de zweer.