



Aanvulling bedrijfsbehandelplan Vleesvee

Koeien

Ontsteking van geboorteweg / Vaginitis

Menginfecties met anaerobe. Ten gevolge van beschadiging geboorteweg tijdens het kalven.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

Overig

Keizersnee/Sectio maar ook bij andere operatieve ingrepen zoals lebmaag of navelbreukoperatie.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

Dikke hak/poot

Dikke hak/poot behandelen met antibiotica en pijnstillers. Bij veel hakbeschadigingen kijk naar comfort ligplekken.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

Longontsteking

Bij hoge koorts (>40 graden) contact opnemen met dierenarts

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

Mastitis

Onderscheid tussen koe ziek en koe niet ziek. Koe niet ziek: eet goed, uier is niet hard en warm en koe heeft geen koorts. Koe ziek: eet minder, melk is afwijkend, uier is niet erg hard, wel warm, pijnlijk en koe heeft koorts. Advies: melkmonster nemen en naar de praktijk brengen voor BO. Behandel met antibiotica in de spier en ook met een pijnstillers.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

Jongvee (tot 2 jaar)

Longontsteking

Acuut

Voorkom longontsteking bij kalveren door ze droog, fris en tochtvrij te huisvesten. Behandel longworminfecties tijdig. Overweeg bij veel problemen het jongvee te enten tegen pinkengriep. Hierdoor wordt de kans op secundaire bacteriële infecties verkleind. Gebruik van nuflor, florkem bij kalveren vanaf 14 dagen leeftijd.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren