



## Aanvulling bedrijfsbehandelplan melkvee

### Koeien

#### Mastitis Derde graad

Gram-negatieve bacteriën bijv. E.coli, Klebsiella spp. Koe is ernstig ziek, eet niet, geeft nauwelijks melk, uier is hard warm en pijnlijk. Koe heeft hoge koorts boven 40.0. Advies: 1. Neem melkmonster. 2. Behandel snel. 3. Trek vaak leeg overdag. 4. Behandel ook met pijnstillers. 5. Behandel met uiermint. Er is geen eerste keus middel geregistreerd voor het gebruik in de uier voor een ernstige mastitis. Laat daarom melkmonster onderzoeken op de praktijk, waardoor gebruik tweede keus middel gerechtvaardigd is.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

#### Ontsteking van geboorteweg / Vaginitis

Menginfecties met anaerobe. Ten gevolge van beschadiging geboorteweg tijdens het kalven.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

## Overig

Sectio / Keizersnede / Andere operatieve ingrepen / Wond infecties.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

## Dikke hak/poot

Dikke hak/poot behandelen met antibiotica en pijnstillers. Bij veel hakbeschadigingen kijk naar comfort ligplekken.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

## Melkziekte

Oorzaak calcium/magnesium tekort rond het kalven. Het is raadzaam om na het toedienen van het infuus de koe ook oraal te behandelen tegen fosfor-tekort (Phosphor Bovisal). Wanneer hierna nog geen verbetering te zien is, de dierenarts bellen.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

### Slepende melkziekte

Oorzaak energie-tekort bij het op gang komen van de lactatie. Voornamelijk 2 tot 8 weken na het kalven.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

### Luchtweginfectie

Bij hoge koorts (>40 graden) contact opnemen met dierenarts

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

## Jongvee

### Longontsteking

#### Acuut

Voorkom longontsteking bij kalveren door ze droog, fris en tochtvrij te huisvesten. Behandel longworminfecties tijdig. Overweeg bij veel problemen het jongvee te enten tegen pinkengriep. Hierdoor wordt de kans op secundaire bacteriële infecties verkleind. Gebruik van nuflor, florkem bij kalveren vanaf 14 dagen leeftijd.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren

## Chronisch

Kans op volledig herstel bij chronische longontsteking is klein.

Reg NL nr.	Middel	Doeldier	Toedieningswijze	Dosering	Freq.	Duur i. dagen	W. tijd M. in uren	W. tijd V. in dagen	Opmerkingen
127107	Alfadexx	Alle	In de spier (IM)	1,5 ml per 50 kg LG	1x per dag	eenmalig	72	8	Niet bij drachtige dieren