



Melkonderzoek

Om het celgetal te bepalen en te achterhalen welke bacterie het celgetal verhoogt, of te bepalen welke bacterie klinische mastitis veroorzaakt, is het van belang melkmonsters per kwartier te nemen.

Het is belangrijk deze zeer zorgvuldig te nemen, om te voorkomen dat stof en bacteriën uit de omgeving in het monster komen en voor een verkeerde uitslag zorgen.

De werkwijze voor het hygiënisch nemen van een melkmonster is als volgt:

Handen goed wassen

1. Gebruik de steriele melkbuisen welke bij de praktijk verkrijgbaar zijn.
2. Schrijf op het etiket datum, koenummer en het kwartier.
3. Maak de spenen goed schoon met een droge doek of met een stuk papier.
4. Melk de eerste stralen weg.
5. Ontsmet daarna de top van de speen met een prop watten met spiritus of met een tepeldoekje.
6. Melk weer enige stralen weg.
7. Verwijder de dop van het monsterbuisje en houd de dop met de onderzijde naar beneden. Dop niet neerleggen!
8. Houd het monsterbuisje zo horizontaal mogelijk en melk het busje bij voorkeur met één straal vol. Voorkom dat vuil in het busje valt.
9. Plaats direct de dop op het busje.
10. Gebruik één monsterbuisje per kwartier.

Melkmonsters graag zo vers mogelijk aanleveren, maximaal 2 dagen in de koelkast bewaren.

Monsters NIET INVRIEZEN. Melkmonsters die bevroren zijn geweest geven geen betrouwbare resultaten bij de celgetalmeting

Melkmonsters welke op werkdagen voor 10.00 uur op de praktijk (locatie Bergeijk) zijn, worden dezelfde dag nog ingezet.