

12

ONTWORMING EN  
12 WEKEN BESCHERMING  
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN

# BRAVECTO® PLUS: PRECIES WAT KATTEN NODIG HEBBEN

Het vertrouwde Bravecto® assortiment wordt uitgebreid met Bravecto® Plus: de langdurige bescherming tegen vlooien en teken PLUS ontworming op maat.



**BRAVECTO®**  
**PLUS**  
BUITENGEWOON BIJZONDER

 **MSD**  
Animal Health  
The Science of Healthier Animals®



## ZEER NIEUWSGIERIG ZEER GEVOELIG

Katten zijn nieuwsgierige, ondeugende, ondernemende huisgenoten die spelenderwijs in de raarste situaties terecht kunnen komen. Daarom houden we van ze. Door dit alledaagse gedrag worden ze blootgesteld aan de gevaren van parasieten. Toch zijn nog veel katten onvoldoende beschermd tegen wormen, vlooiën en teken.

### **Wat zijn mogelijke redenen waarom eigenaren hun katten niet behandelen tegen parasieten?**


- Lastig te behandelen.
- Onbekend met het belang van goede bescherming tegen parasieten.
- Vergeten van de behandeling.

HET OP DE JUISTE MANIER BESCHERMEN  
VAN KATTEN TEGEN PARASieten IS EEN UITDAGING.  
ELKE KAT IS UNIEK EN VRAAGT DUS OM  
EEN INDIVIDUEEL BEHANDELPLAN.

# ONTWORMINGSADVIES ESCCAP

Het advies van ESCCAP is om een kat volgens onderstaand schema preventief te ontwormen. De gemiddelde kat valt in risicogroep B (4x per jaar tegen spoelwormen). Ontwormen tegen spoelwormen is in het belang van de gezondheid van mens en dier. De larven van de kattenspoelworm kunnen namelijk de mens (vooral kinderen) besmetten en klachten veroorzaken. Katten raken besmet via de moedermelk, contact met grond (zoals de tuin) en door het eten van prooidieren of rauw vlees. Lintwormen bij katten vormen geen noemenswaardig risico voor de kat en de volksgezondheid en vereisen daarom géén preventieve aanpak. De ESCCAP richtlijnen geven daarom aan, katten pas te behandelen als de aanwezigheid van lintwormen of vlooiën is aangetoond.

**Volg het onderstaande schema en geef huisdiereigenaren een advies op maat:**



- Indien lintwormsegmentjes worden gezien rond de anus of op de ontlasting: ontworm tegen lintwormen en start vlooiënbestrijding.
- Het regelmatig laten onderzoeken van de ontlasting van hond of kat is een goed alternatief voor het 'standaard' ontwormingsadvies.
- Ruim de ontlasting direct op en deponeer dit in een container (gewoon afval) en niet in de groenbak.

## Ontworming van kittens

- Ontwormen vanaf een leeftijd van 3 weken, waarbij de behandeling iedere 2 weken herhaald wordt tot 2 weken na het spenen, daarna maandelijks tot een half jaar leeftijd.
- Zogende poezen steeds tegelijk met de kittens ontwormen.



ONTWORMING EN  
12 WEKEN BESCHERMING  
TEGEN VLOOIEN EN TEKEN



## HET VERTROUWDE BRAVECTO ASSORTIMENT WORDT UITGEBREID MET BRAVECTO® PLUS

**Bravecto® Plus is een buitengewoon bijzondere SPOT-ON tegen vlooien, teken én wormen;** speciaal ontwikkeld voor katten. Bravecto® Plus bouwt voort op de bewezen effectiviteit, het gebruiksgemak en de langdurige bescherming zoals u dat gewend bent van Bravecto®.

**Bravecto® Plus bevat:**

### Fluralaner

Beschermt 12 weken tegen vlooien en teken



vlo



teek

**PLUS**

### Moxidectine

Brede bescherming tegen wormen



spoelworm



haakworm



hartworm

DE UNIEKE SAMENSTELLING VAN BRAVECTO® PLUS  
BIEDT DE MOGELIJKHEID OM KATTEN GEMAKKELIJK,  
CONFORM ESCCAP ADVIEZEN, PREVENTIEF TE BESCHERMEN  
TEGEN VLOOIEN, TEKEN EN WORMEN.

# DE EXTRA **PLUS** VAN BRAVECTO®

## Gebruiksgemak

Eigenaren geven de voorkeur aan een 12-wekelijkse behandeling.<sup>1</sup>

## Therapietrouw

Langere werkingsduur, minder vaak behandelen dus minder kansen om herbehandeling te vergeten.<sup>1</sup>

## Langdurige bescherming

Kan helpen het aantal maanden behandeling per jaar te verhogen.<sup>2</sup>  
Goed voor volksgezondheid, dierenwelzijn en uw praktijk.

## Tevreden eigenaar

Gemak en langdurig beschermd.

## Conform ESCCAP richtlijnen

Voor een gemiddelde kat volstaat één behandeling per 12 weken voor de geadviseerde<sup>3</sup> preventieve behandeling tegen wormen, vlooien en teken.

### Referenties:

1. Lavan RP et al. J Vet Sci Technol. 2017; 8: 439.
2. Lavan RP et al. Parasit Vectors. 2017;10: 284.
3. ESCCAP Richtlijn 01 (2e druk) en ESCCAP richtlijn 3-4 (5e druk).



## FARMACEUTISCHE VORM EN SAMENSTELLING

Spot-on oplossing. Bevat fluralaner en moxidectine.

## INDICATIES EN DOELDIER

Voor katten met (risico op) gecombineerde parasitaire infestaties van teken en vlooien, maagdarmpwormen of hartwormen. Dit systemisch werkend diergeneesmiddel:

- heeft een onmiddellijke en aanhoudende vlooien- (*Ctenocephalides felis*) en teken- (*Ixodes ricinus*) dodende werking gedurende 12 weken.
- kan gebruikt worden als onderdeel van een behandelingsstrategie tegen vlooienallergiedermatitis (VAD).
- heeft een dodend effect op intestinale rondwormen (4<sup>e</sup> stadium larven, immature en volwassen wormen van *Toxocara cati*) en haakwormen (4<sup>e</sup> stadium larven, immature en volwassen vormen van *Ancylostoma tubaeforme*).
- voorkomt hartwormziekte veroorzaakt door *Dirofilaria immitis* gedurende 8 weken. Het is werkzaam tegen larven (L3 en L4) van *Dirofilaria immitis* en niet voldoende tegen volwassen hartwormen. Katten van 6 maanden leeftijd of ouder in gebieden waar hartworm endemisch is (of katten die op reis zijn geweest naar endemische gebieden) dienen te worden getest op aanwezige volwassen hartworminfecties voordat het diergeneesmiddel preventief gebruikt wordt tegen hartwormziekte.
- is alleen geïndiceerd bij gebruik tegen teken of vlooien in aanwezigheid van één of meerdere van de andere doelparasieten.

Vlooien en teken moeten gehecht zijn aan de gastheer en beginnen met voeden om blootgesteld te worden aan het werkzame bestanddeel. Binnen 48 uur na behandeling van teken (*I. ricinus*) en vlooien (*C. felis*) treedt het (dodend) effect op.

## DOSERING EN TOEDIENINGSINTERVAL

Eén pipet per kat. Kies de juiste pipet bij het gewicht van de kat.		
Bravecto® Plus (0,40 ml) 112,5 mg fluralaner en 5,6 mg moxidectine	Bravecto® Plus (0,89 ml) 250 mg fluralaner en 12,5 mg moxidectine	Bravecto® Plus (1,79 ml) 500 mg fluralaner en 25,0 mg moxidectine
Katten van 1,2 - 2,8 kg	Katten > 2,8 - 6,25 kg	Katten > 6,25 - 12,5 kg

Voor katten met een gewicht van meer dan 12,5 kg gebruikt u een combinatie van twee pipetten die het beste past bij het lichaamsgewicht.

Dit product is voor topicaal gebruik en dient niet oraal toegediend te worden.

Niet gebruiken bij kittens jonger dan 9 weken en/of katten lichter dan 1,2 kg omdat hierover geen informatie beschikbaar is.

Indien nodig kunnen katten met een interval van 12 weken herbehandeld worden.

## OVERDOSERING

Er zijn geen bijwerkingen waargenomen na topicale toediening bij kittens met een leeftijd van 9-13 weken en een gewicht van 0,9-1,9 kg die op 3 momenten een overdosering toegediend kregen van tot 5 maal de maximaal aanbevolen dosering (93 mg fluralaner + 4,65 mg moxidectine, 279 mg fluralaner + 13,95 mg moxidectine en 465 mg fluralaner + 23,25 mg moxidectine /kg lichaamsgewicht) met een korter interval (interval van 8 weken) dan aanbevolen. Orale opname van het diergeneesmiddel bij de maximale aanbevolen dosering van 93 mg fluralaner + 4,65 mg moxidectine/kg lichaamsgewicht kan wat voorbijgaande speekselvorming of in sommige gevallen braken direct na toediening veroorzaken.


## CONTRA-INDICATIES, BIJWERKINGEN EN INTERACTIES

Niet direct op huidlaesies gebruiken. Milde en voorbijgaande huidreacties op de toedieningsplek (kaalheid, huidschilfers en jeuk) zijn vaak ( $\geq 1 - <10\%$ ) waargenomen in klinische studies.


Overige bijwerkingen die in klinische studies kort na toediening soms ( $\geq 0,1 - <1\%$ ) werden waargenomen zijn: kortademigheid na het likken van de toedieningsplaats, kwijlen, braken, braken met bloed, diarree, sloomheid, koorts, versnelde ademhaling, verwijding van de pupil.

Moxidectine is een substraat voor P-glycoproteïne. Daarom dienen tijdens behandeling met Bravecto® Plus diergeneesmiddelen die P-glycoproteïne kunnen remmen (zoals cyclosporine, ketoconazol, spinosad, verapamil) uitsluitend gebruikt te worden overeenkomstig de baten/risicobeoordeling van de verantwoordelijke dierenarts.

## TOEDIENINGSINSTRUCTIE BRAVECTO PLUS VOOR KATTEN:



Scheur het aluminium sachet open.



Doe handschoenen aan.




Houd de pipet met de dop omhoog. Knijp niet in de pipet.




Draai en gebruik: draai de knop 1x rond. Houd de pipet met de dop naar boven. De pipet is nu klaar voor gebruik.



Let op: de dop komt er niet af!



Het product dient bij katten tot 6,25 kg aangebracht te worden op **één** plek aan de schedelbasis (waar de kat met de tong niet bij kan). Bij katten zwaarder dan 6,25 kg: **twee** plekken.



Spreid de haren en druppel de hele inhoud van de pipet direct op de huid van de kat. Hoe beter u de inhoud van de pipet direct op de huid druppelt, hoe minder u het in de vacht ziet.

Voorkom contact met de toedieningsplaats totdat die niet meer zichtbaar is. Laat de toedieningsplaats drogen voordat de kat in contact komt met leder, stof, kunststof en andere delicate oppervlakken. Dit helpt vlekken te voorkomen.

## GEBRUIK TIJDENS DRACHT, LACTATIE EN FOK

De veiligheid van het diergeneesmiddel is niet vastgesteld tijdens dracht, lactatie en fok en gebruik bij deze dieren wordt daarom afgeraden.

## WAARSCHUWINGEN / OVERIGE INFORMATIE

- Om blootgesteld te worden aan fluralaner moeten parasieten zich beginnen te voeden op de gastheer; het risico op overdracht van parasietgebonden ziekten kan daarom niet worden uitgesloten.
- Bewaar het product tot gebruik in de oorspronkelijke verpakking om te voorkomen dat kinderen in contact komen met het product en ter bescherming tegen uitdroging of vochtopname. De sachets moeten pas vlak voor gebruik geopend worden. Er zijn geen andere speciale voorzorgen voor de bewaring.
- Voorkom contact met de ogen van het dier en dat pas behandelde dieren elkaar schoonlikken.
- Het actieve bestanddeel in het product is zeer lipofiel en hecht aan de huid; na morsen kan het product ook aan oppervlakken hechten. In geval van morsen, bijvoorbeeld op tafel of vloeroppervlakken, de overmaat aan product verwijderen met een papieren tissue en het gebied schoonmaken met zeep.
- Niet eten, drinken of roken tijdens de behandeling.
- Voorkom contact met huid en/of ogen, inclusief hand-og contact. Dit product kan irriterend zijn voor de huid (overgevoeligsreactie, huiduitslag, tinteling of verdoofd gevoel) en/of ogen. In geval van contact met de ogen, onmiddellijk grondig spoelen met water.
- Zorg ervoor dat de toedieningsplek op het dier droog en niet meer zichtbaar is voordat er weer contact is met de toedieningsplek.
- Laat de toedieningsplaats drogen (kan tot 48 uur duren) voordat contact met leder, stof, kunststof en andere delicate oppervlakken wordt toegelaten. Dit helpt vlekken te voorkomen.
- Het product is zeer brandbaar. Houd het weg van warmte, vonken, open vuur of andere ontstekingsbronnen.

## VERPAKKING, KANALISATIESTATUS EN REGISTRATIENUMMERS

Kartonnen doos met daarin een aluminiumfolie sachet dat 1 pipet bevat. UDA. REG NL 120324, 120325, 120326

## BRAVECTO® PLUS BIEDT VELE VOORDELEN:

- **3-in-1 oplossing** tegen wormen, vlooien en teken.
- Bevat fluralaner en moxidectine.
- 12 weken gebruiksgemak, verhoogt therapietrouw en daarmee dierenwelzijn.
- Werkt systemisch; beschermt van kop tot staart.
- Conform ESCCAP adviezen.
- Past uitstekend in een zorgplan.
- UDA: alleen via de dierenarts verkrijgbaar.

